

Blæreskylning med calmette vaccine

BCG

Urinvejskirurgisk Afdeling L

Hvad er blæreskylning?

Du får blæren skyllet med BCG, som er calmette vaccine.

Hvorfor skylles blæren med BCG?

Blæreskylning med BCG anvendes til behandling mod blærepolypper og overfladisk kræft i blæren.

Hvordan virker BCG?

Med BCG påføres blæren en svær betændelsestilstand, således at polypper og forstadier til kræft ikke kan vokse.

Hvordan foregår behandlingen?

Skylningerne foregår ved, at der føres et kateter (tyndt, blødt rør) op i blæren, og blæren tømmes for urin. Derefter sprøjtes 50 ml BCG op i blæren gennem kateteret. Herefter fjernes kateteret .

Hvor længe skal BCG blive i blæren?

Helst 2 timer. Du skal derfor forsøge at holde på vandet i 2 timer. Du behøver ikke at blive på hospitalet i den tid.

Hvor mange gange skal blæren skylles?

Blæren skal almindeligvis skylles i alt 6 gange med 1 uges interval.

Gør det ondt?

Skylning gør ikke ondt, men virkningen af BCG viser sig ofte med følgende symptomer:

- svie ved vandladning og hyppig vandladning
- feber og influenzalignende symptomer
- let blodig urin

Generne vil normalt være lette, og du kan forvente at kunne udføre normal aktivitet uden besvær. Symptomerne vil ofte forsvinde indenfor ½-1 døgn. Er symptomerne meget generende bør dette meddeles Urinvejskirurgisk Ambulatorium tlf. 6541 2211.

Vigtigt Hvis BCG skal virke bedst muligt må den ikke fortyndes af for meget urin. Vi vil derfor bede dig om at drikke så lidt som muligt de sidste 2-3 timer, inden du møder til behandlingen. Undgå desuden at tage eventuel vanddrivende medicin.

Venlig hilsen

Urinvejskirurgisk Afdeling L

- Odense: Sengeafsnit L1 - tlf. 6541 2231

- Svendborg: Sengeafsnit L2 - tlf. 6320 2081

ID 6698 marts 2014